

平成 28 年

「生体分子コバレント修飾の革新的解析拠点形成」プロジェクト研究成果

医薬分子化学 研究室

【原著】

- Egawa D, Itoh T, Kato A, Kataoka S, Anami Y, **Yamamoto K**, SRC2-3 binds to vitamin D receptor with high sensitivity and strong affinity. *Bioorg Med Chem.* **25**, 568–574 (2017). DOI: 10.1016/j.bmc.2016.11.020 [[BMC](#)]
- Anami Y, Shimizu N, Ekimoto T, Egawa D, Itoh T, Ikeguchi M, **Yamamoto K**. Apo- and Antagonist-Binding Structures of Vitamin D Receptor Ligand-Binding Domain Revealed by Hybrid Approach Combining Small-Angle X-ray Scattering and Molecular Dynamics. *J. Med. Chem.*, **59**, 7888–7900 (2016) DOI: 10.1021/acs.jmedchem.6b00682. [[ACS](#)]
- Egawa D, Itoh T, Akiyama Y, Saito T, **Yamamoto K**. 17-oxoDHA is a PPAR α/γ dual covalent modifier and agonist. *ACS Chem. Biol.* **11**, 2447–2455 (2016). DOI: 10.1021/acscchembio.6b00338 [[ACS](#)]
- Kato A, Anami Y, Egawa D, Itoh T, **Yamamoto K**. Helix12-stabilization antagonist of vitamin D receptor. *Bioconjugate Chem.* **27**, 1750–1761 (2016). DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00246. [[ACS](#)]
- Mise S, Haga Y, Itoh T, Kato A, Fukuda I, Goto E, **Yamamoto K**, Yabu M, Matsumura C, Nakano T, Sakaki T, Inui H. Structural determinants of the position of 2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl (CB118) hydroxylation by mammalian cytochrome P450 monooxygenases. *Toxicol. Sci.* **152** (2), 340–348 (2016). [[PubMed](#)]
- Itoh T, Saito T, Yamamoto Y, Ishida H, **Yamamoto K**. Gram scale synthesis of specialized pro-resolving mediator 17(S)-HDHA using lipoxygenase enhanced by water-soluble reducing agent TCEP. *Bioorg Med Chem. Lett.* **26**, 343–345 (2016). Doi:10.1016/j.bmcl.2015.12.011. [[BMCL](#)]

【著書】

- **山本恵子**. スタンダード薬学シリーズ II 第3巻 化学系薬学II 生体分子・医薬品の化学による理解; SBO17,18,33,34
東京化学同人 日本薬学会編 pp143–157, 260–271. 2016